

Seri bahan kuliah Algeo #29

Perkalian Geometri **(Bagian 1)**

Update 2023

Bahan kuliah IF2123 Aljabar Linier dan Geometri

Oleh: Rinaldi Munir

Program Studi Teknik Informatika

STEI-ITB

2023

Sumber:

John Vince, *Geometric Algebra for Computer Graphics*. Springer. 2007

Perkalian Vektor

Perkalian vektor yang sudah dipelajari:


1. Perkalian titik (*dot product* atau *inner product*): $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$
2. Perkalian silang (*cross product*): $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$
3. Perkalian luar (*outer product*): $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$

Yang akan dipelajari selanjutnya \rightarrow perkalian geometri: ab

Perkalian Geometri

- Perkalian geometri dioperasikan pada *multivector* yang mengandung skalar, area, dan volume
- Perkalian geometri ditemukan oleh William Kingdom Clifford (1845 – 1879)
- Perkalian geometri dua buah vektor a dan b didefinisikan sebagai berikut:

$$ab = a \cdot b + a \wedge b$$



Sifat-sifat Perkalian Geometri

1. Asosiatif

$$(i) a(bc) = (ab)c = abc$$

$$(ii) (\lambda a)b = \lambda(ab) = \lambda ab$$

2. Distributif

$$(i) a(b + c) = ab + ac$$

$$(ii) (b + c)a = ba + ca$$

3. Modulus

$$a^2 = aa = \|a\|^2$$

- Bukti untuk 3:

Misalkan $a = a_1e_1 + a_2e_2$

maka

$$a^2 = aa = a \cdot a + a \wedge a$$

$$= a_1a_1 + a_2a_2 + (a_1e_1 + a_2e_2) \wedge (a_1e_1 + a_2e_2)$$

$$= a_1^2 + a_2^2 + a_1a_1(e_1 \wedge e_1) + a_1a_2(e_1 \wedge e_2) + a_2a_1(e_2 \wedge e_1) + a_2a_2(e_2 \wedge e_2)$$

$$= a_1^2 + a_2^2 + 0 + a_1a_2(e_1 \wedge e_2) + a_2a_1(e_2 \wedge e_1) + 0$$

$$= a_1^2 + a_2^2 + a_1a_2(e_1 \wedge e_2) - a_2a_1(e_1 \wedge e_2)$$

$$= a_1^2 + a_2^2 + a_1a_2(e_1 \wedge e_2) - a_1a_2(e_1 \wedge e_2)$$

$$= a_1^2 + a_2^2 + 0$$

$$= a_1^2 + a_2^2$$

$$= (\sqrt{a_1^2 + a_2^2})^2$$

$$= \|a\|^2$$

Contoh 1: Misalkan $a = 3e_1 + 4e_2$ dan $b = 2e_1 + 5e_2$, hitunglah ab dan a^2

Jawaban:

$$\begin{aligned}ab &= a \cdot b + a \wedge b \\&= \{(3)(2) + (4)(5)\} + (3e_1 + 4e_2) \wedge (2e_1 + 5e_2) \\&= \{6 + 20\} + 6(e_1 \wedge e_1) + 15(e_1 \wedge e_2) + 8(e_2 \wedge e_1) + 20(e_2 \wedge e_2) \\&= 26 + (6)(0) + 15(e_1 \wedge e_2) + 8(e_2 \wedge e_1) + (20)(0) \\&= 26 + 15(e_1 \wedge e_2) - 8(e_1 \wedge e_2) \\&= 26 + 7(e_1 \wedge e_2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a^2 &= aa = a \cdot a + a \wedge a = \|a\|^2 \\&= (\sqrt{3^2 + 4^2})^2 \\&= 3^2 + 4^2 \\&= 9 + 16 \\&= 25\end{aligned}$$

- Modulus ab dihitung dengan dalil Phytagoras sbb:

$$\begin{aligned}\|ab\|^2 &= \|a \cdot b\|^2 + \|a \wedge b\|^2 \\ &= \|a\|^2 \|b\|^2 \cos^2 \theta + \|a\|^2 \|b\|^2 \sin^2 \theta \\ &= \|a\|^2 \|b\|^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\ &= \|a\|^2 \|b\|^2 \quad (\text{sebab } \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1)\end{aligned}$$

Jadi,

$$\|ab\| = \|a\| \|b\|$$

- Kemudian,

$$ab = a \cdot b + a \wedge b$$

$$ba = b \cdot a + b \wedge a = a \cdot b - a \wedge b$$

$$\begin{aligned} ab - ba &= (a \cdot b + a \wedge b) - (a \cdot b - a \wedge b) \\ &= (a \wedge b) + (a \wedge b) = 2(a \wedge b) \end{aligned}$$

Jadi,

$$(a \wedge b) = \frac{1}{2}(ab - ba)$$

- Selanjutnya,

$$ab + ba = (a \cdot b + a \wedge b) + (a \cdot b - a \wedge b) = 2(a \cdot b)$$

Jadi,

$$(a \cdot b) = \frac{1}{2}(ab + ba)$$

Perkalian geometri vektor-vektor basis

- Vektor-vektor basis satuan standard adalah e_1, e_2, e_3, \dots

$$e_1 e_1 = e_1 \cdot e_1 + e_1 \wedge e_1 = 1 + 0 = 1 \quad \rightarrow \quad e_1 e_1 = e_1^2 = 1$$

- Dengan cara yang sama, maka $e_2 e_2 = e_2^2 = 1$ dan $e_3 e_3 = e_3^2 = 1$

- Perkalian geometri e_1 dan e_2 :

$$e_1 e_2 = e_1 \cdot e_2 + e_1 \wedge e_2 = 0 + e_1 \wedge e_2 = e_1 \wedge e_2 \quad \rightarrow \quad e_1 e_2 = e_1 \wedge e_2$$

Note: $e_1 \wedge e_2$ dapat diganti dengan notasi $e_1 e_2$ atau e_{12}

$$e_2 e_1 = e_2 \cdot e_1 + e_2 \wedge e_1 = 0 + e_2 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_2 \quad \rightarrow \quad e_2 e_1 = -e_1 \wedge e_2$$

Note: $e_2 \wedge e_1$ dapat diganti dengan notasi $-e_1 e_2$ atau $-e_{12}$

Soal Latihan dan Jawaban

(Soal UAS 2019)

Jika diketahui tiga buah vektor:

$$a = 2e_1 + 2e_2 + e_3$$

$$b = 3e_1 + 2e_2 - 2e_3$$

$$c = e_1 + 2e_2 - e_3$$

Hitunglah :

1). $(a + b)c$

2). $(a \wedge b)c$

3). $(a + b) \cdot c$

$$\begin{aligned}
1) \quad a + b &= (2e_1 + 2e_2 + e_3) + (3e_1 + 2e_2 - 2e_3) = 5e_1 + 4e_2 - e_3 \\
(a + b)c &= (5e_1 + 4e_2 - e_3)(e_1 + 2e_2 - e_3) \\
&= 5 + 10e_{12} - 5e_{13} + 4e_{21} + 8 - 4e_{23} - e_{31} - 2e_{32} + 1 \\
&= 14 + (10 - 4)e_{12} + (-4 + 2)e_{23} + (5 - 1)e_{31} \\
&= 14 + 6e_{12} - 2e_{23} + 4e_{31}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2) \quad (a \wedge b) &= (2e_1 + 2e_2 + e_3) \wedge (3e_1 + 2e_2 - 2e_3) \\
&= (4 - 6)e_{12} + (-4 + 2)e_{23} + (3 + 4)e_{31} \\
&= -2e_{12} - 2e_{23} + 7e_{31}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(a \wedge b)c &= (-2e_{12} - 2e_{23} + 7e_{31})(e_1 + 2e_2 - e_3) \\
&= 2e_2 - 4e_1 + 2e_{123} - 2e_{123} + 4e_3 + e_2 + 7e_3 + 14e_{123} + 7e_1 \\
&= (-4 + 7)e_1 + (2 + 1)e_2 + (4 + 7)e_3 + (2 - 2 + 14)e_{123} \\
&= 3e_1 + 3e_2 + 11e_3 + 14e_{123}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) (a + b) \cdot c &= (5e_1 + 4e_2 - e_3) \cdot (e_1 + 2e_2 - e_3) \\ &= (5)(1) + (4)(2) + (-1)(-1) \\ &= 5 + 8 + 1 \\ &= 14 \end{aligned}$$

Sifat-sifat Imajiner *Outer Product*

- Kuadratkan *outer product* dari vektor-vektor basis satuan:

$$\begin{aligned} (e_1 \wedge e_2)^2 &= (e_1 \wedge e_2)(e_1 \wedge e_2) \\ &= e_1 e_2 e_1 e_2 \\ &\quad \begin{array}{c} \longleftrightarrow \\ -e_1 e_2 \end{array} \\ &= -e_1 e_1 e_2 e_2 \\ &= -e_1^2 e_2^2 \\ &= -1^2 1^2 \\ &= -1 \end{aligned}$$

- Jadi, $(e_1 \wedge e_2)^2 = -1$ \rightarrow mirip dengan imajiner $i^2 = -1$
- Aljabar Geometri memiliki hubungan dengan bilangan kompleks, bahkan juga dengan quaternion, dan dapat melakukan rotasi pada ruang vektor dimensi n .

Pseudoscalar

- Elemen-elemen aljabar di dalam aljabar geometri:
 - skalar \rightarrow grade-0
 - vektor \rightarrow grade-1
 - bivector \rightarrow grade-2
 - trivector \rightarrow grade-3
 - dst
- Di dalam setiap aljabar (aljabar skalar, aljabar vektor, aljabar bivector, dst), elemen paling tinggi dinamakan *pseudoscalar* dan *grade-nya* diasosiasikan dengan dimensi ruangnya.
- Contoh: - di R^2 elemen *pseudoscalar* adalah *bivector* $e_1 \wedge e_2$ dan berdimensi 2.
 - di R^3 elemen *pseudoscalar* adalah *trivector* $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$

Rotasi dengan *Pseudoscalar*

- *Pseudoscalar* dapat digunakan sebagai *rotor* (penggerak rotasi).
- Misalkan *pseudoscalar* di \mathbb{R}^2 dilambangkan dengan I , jadi

$$I = \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_{12}$$

- Perkalian vektor satuan \mathbf{e}_1 dan \mathbf{e}_2 dengan I :

$$\mathbf{e}_1 I = \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1^2 \mathbf{e}_2 = (1) \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2$$

$$\mathbf{e}_2 I = \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_{12} = \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2 (-\mathbf{e}_2 \mathbf{e}_1) = -\mathbf{e}_2^2 \mathbf{e}_1 = -(1) \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1$$


$$-\mathbf{e}_1 I = -\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1^2 \mathbf{e}_2 = -(1) \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2$$

$$-\mathbf{e}_2 I = -\mathbf{e}_2 \mathbf{e}_{12} = -\mathbf{e}_2 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2 (-\mathbf{e}_2 \mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_2^2 \mathbf{e}_1 = (1) \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1$$

- Perkalian vektor $a = a_1e_1 + a_2e_2$ dengan I :

$$\begin{aligned}
 aI &= ae_1e_2 \\
 &= (a_1e_1 + a_2e_2)e_1e_2 \\
 &= a_1e_1^2e_2 + a_2e_2e_1e_2 \\
 &= a_1e_2 - a_2e_2^2e_1 : \\
 &= -a_2e_1 + a_1e_2
 \end{aligned}$$

yang sama dengan memutar vektor sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam.



- Perkalian vektor I dengan $a = a_1e_1 + a_2e_2$:

$$\begin{aligned}
 Ia &= e_1e_2a \\
 &= e_1e_2(a_1e_1 + a_2e_2) \\
 &= a_1e_1e_2e_1 + a_2e_1e_2^2 \\
 &= -a_1e_2 + a_2e_1 \\
 &= a_2e_1 - a_1e_2
 \end{aligned}$$

yang sama dengan memutar vektor sejauh 90 derajat searah jarum jam.

- Jadi,

$$aI = -Ia$$

- Perkalian vektor dengan *pseudoscalar* tidak komutatif.




TABLE 8.1

Products in \mathbb{R}^2			
Type	Product	Absolute Value	Notes
inner	$e_1 \cdot e_1$	1	$e_2 \cdot e_2 = e_1 \cdot e_1$
outer	$e_1 \wedge e_1$	0	$e_2 \wedge e_2 = e_1 \wedge e_1$
geometric	e_1^2	1	$e_2^2 = e_1^2$ $e_1 I = -I e_1$
inner	$e_1 \cdot e_2$	0	$e_2 \cdot e_1 = e_1 \cdot e_2$
outer	$e_1 \wedge e_2$	1	$e_1 \wedge e_2 = -(e_2 \wedge e_1)$
geometric	$e_1 e_2$	1	$e_{12} = -e_{21}$ $e_{12} = I$ $I^2 = -1$
inner	$a \cdot a$	$\ a\ ^2$	
outer	$a \wedge a$	0	
geometric	a^2	$\ a\ ^2$	
inner	$a \cdot b$	$\ a\ \ b\ \cos \theta$ $a_1 b_1 + a_2 b_2$	$a \cdot b = \frac{1}{2}(ab + ba)$
outer	$a \wedge b$	$\ a\ \ b\ \sin \theta$ $a_1 b_2 - a_2 b_1$	$a \wedge b = \frac{1}{2}(ab - ba)$ $a \wedge b = (a_1 b_2 - a_2 b_1)e_1 \wedge e_2$
geometric	ab	$\ a\ \ b\ $	$ab = a \cdot b + a \wedge b$ $aI = -Ia$

Hubungan antara vektor, bivector, dan bilangan kompleks

- Diberikan vektor $a = a_1e_1 + a_2e_2$ dan $b = b_1e_1 + b_2e_2$ di \mathbb{R}^2 , maka

$$\begin{aligned} ab &= (a_1e_1 + a_2e_2)(b_1e_1 + b_2e_2) \\ &= a_1b_1e_1^2 + a_1b_2e_{12} + a_2b_1e_{21} + a_2b_2e_2^2 \\ &= a_1b_1 + a_2b_2 + a_1b_2e_{12} - a_2b_1e_{12} \\ &= \underbrace{(a_1b_1 + a_2b_2)}_{a \cdot b} + \underbrace{(a_1b_2 - a_2b_1)}_{a \wedge b} e_{12} \\ &= \underbrace{(a_1b_1 + a_2b_2)}_{\text{skalar}} + \underbrace{(a_1b_2 - a_2b_1)}_{\text{bivector}} I \end{aligned}$$

- Perhatikan bahwa

$$ab = (a_1b_1 + a_2b_2) + (a_1b_2 - a_2b_1)I$$

ekivalen dengan bilangan kompleks $Z = p + qi$.

- Jadi, kita dapat membentuk bilangan yang ekivalen dengan bilangan kompleks Z yang dibentuk dengan mengkombinasikan skalar dengan *bivector*:

$$Z = a_1 + a_2e_{12} = a_1 + a_2I$$

yang dalam hal ini a_1 adalah bagian riil dan a_2 bagian imajiner.

- Vektor a dapat dikonversi menjadi bilangan kompleks Z sebagai berikut. Diberikan vektor a adalah $a = a_1e_1 + a_2e_2$, maka

$$e_1a = e_1(a_1e_1 + a_2e_2) = a_1e_1^2 + a_2e_1e_2 = a_1 + a_2I.$$

Jadi,

$$e_1a = Z$$

- Kalau urutan perkaliannya dibalik sebagai berikut:

$$ae_1 = (a_1e_1 + a_2e_2)e_1 = a_1e_1^2 + a_2e_2e_1 = a_1 - a_2I$$

maka hasilnya adalah bilangan kompleks sekawan (conjugate) \bar{Z} .

$$ae_1 = \bar{Z}$$

Soal Latihan Mandiri

1. (Soal UAS 2018)

Diberikan tiga buah vektor:

$$a = 2e_1 + e_2 + e_3$$

$$b = 3e_1 + 5e_2 - 2e_3$$

$$c = -e_1 + 2e_2 - e_3$$

hitunglah :

$$1). a(b \wedge c) \quad 2). a \cdot (b \wedge c) \quad 3). a(b + c)$$

2. (Soal UAS 2019)

Jika $I_n = e_{123\dots n}$, adalah *pseudoscalar* di \mathbb{R}^n , tuliskan ekspresi berikut dalam bentuk yang paling sederhana:

1). $I_1 I_2 I_3$

2). $e_1 I_2 I_3 I_4 I_5$

3). $(I_3)^4 (I_2)^2 I_3 I_2$

3. (Soal UAS 2018)

Misalkan a adalah sebuah vektor $5e_1 - 2e_2$. Bagaimana cara merotasikan vektor a searah jarum jam sebesar 90° dengan *pseudo-scalar*. Tentukan bayangan a (misalkan a').

Multivector

- ***Multivector*** adalah objek yang mengandung skalar, vektor, bivector, dan objek lain yang dihasilkan dengan perkalian geometri.
- *Multivector* dapat dijumlahkan atau dikalikan seperti objek-objek geometri lainnya
- *Multivector* di \mathbb{R}^2 mengandung skalar, vektor, dan *bivector*.
- *Multivector* di \mathbb{R}^3 mengandung skalar, vektor, *bivector*, dan trivector.
- Dan seterusnya untuk *multivector* di ruang dimensi yang lebih tinggi.

Multivector di \mathbb{R}^2


- *Multivector* di \mathbb{R}^2 merupakan kombinasi linier dari skalar, vektor, dan *bivector*. Elemen-elemen di dalam *multivector* diresumekan pada tabel berikut:

TABLE 8.2

Element	Symbol	Grade
1 scalar	λ	0
2 vectors	$\{e_1, e_2\}$	1
1 unit bivector	$e_1 \wedge e_2 = e_{12}$	2

- Multivector A di \mathbb{R}^2 dinyatakan sebagai

$$A = \lambda_0 + \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 (e_1 \wedge e_2)$$



skalar vektor bivector

Contoh 1: Diberikan dua buah *multivector* A dan B sebagai berikut:

$$A = 4 + 3e_1 + 4e_2 + 5e_{12}$$

$$B = 3 + 2e_1 + 3e_2 + 4e_{12}$$

(i) Penjumlahan

$$A + B = 7 + 5e_1 + 7e_2 + 9e_{12}$$

$$A - B = 1 + e_1 + e_2 + e_{12}$$

(ii) Perkalian

$$AB = (4 + 3e_1 + 4e_2 + 5e_{12})(3 + 2e_1 + 3e_2 + 4e_{12})$$

(lakukan perkalian suku-suku seperti biasa,

dan gunakan $e_1^2 = e_2^2 = 1$, $e_{21} = -e_{12}$, $e_{12}^2 = -1$)

$$= 10 + 16e_1 + 26e_2 + 32e_{12} \quad (\text{tunjukkan!!})$$

Rotasi Vektor di \mathbb{R}^2

- Kembali ke bilangan kompleks

$$z = a + bi$$

- Rotasi bilangan kompleks z sejauh ϕ berlawanan arah jarum jam adalah:

$$z' = ze^{i\phi}$$

yang dalam hal ini,

$$e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi \quad (\text{formula Euler})$$

- Karena $i^2 = -1$, maka

$$e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi$$

sehingga

$$z' = ze^{i\phi}$$

- Jika Z adalah *multivector* yang terdiri dari scalar dan *bivector*, yang identik dengan bilangan kompleks z :

$$Z = a_1 + a_2 e_{12} \quad (\text{identik dengan } z = a + bi)$$

maka


$$Z' = Ze^{I\phi}$$

- Untuk vektor $v = a_1 e_1 + a_2 e_2$, dapat dibuktikan bahwa rotasi v sejauh ϕ menghasilkan vektor bayangan:

$$v' = ve^{I\phi}$$

Contoh 2: Misalkan $v = 2e_1$ diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka


$$\begin{aligned} v' &= ve^{I\phi} = 2e_1 e^{I\phi} \\ &= 2e_1 (\cos 90^\circ + I \sin 90^\circ) \\ &= 2e_1 (0 + I) = 2e_1 I \\ &= 2e_1 e_{12} \quad (\text{ingat, } I = e_1 \wedge e_2 = e_{12} = e_1 e_2) \\ &= 2e_1 e_1 e_2 = 2e_1^2 e_2 = 2(1)^2 e_2 = 2e_2 \end{aligned}$$



Contoh 3: Tentukan bayangan vektor $v = 2e_1 + e_2$ yang diputar 90 derajat berlawanan arah jarium jam.

Jawaban:

$$\begin{aligned}v' &= ve^{i\phi} = (2e_1 + e_2) e^{i\phi} \\&= (2e_1 + e_2) (\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ) \\&= (2e_1 + e_2)(0 + i) \\&= (2e_1 + e_2)(i) \\&= (2e_1 + e_2)(e_{12}) \\&= 2e_1e_1e_2 + e_2e_1e_2 \\&= 2e_1^2e_2 - e_2^2e_1 \\&= 2(1)^2e_2 - (1)^2e_1 \\&= -e_1 + 2e_2\end{aligned}$$



Latihan


- Diberikan sebuah vektor $v = 4e_1 - 3e_2$, tentukan bayangan vektor setelah
 - (a) diputar sejauh 45 derajat berlawanan arah jarum jam
 - (b) diputar sejauh 120 derajat berlawanan arah jarum
 - (c) diputar sejauh 90 searah jarum jam

Trivector

- Pada materi sebelumnya (Algeo 22) sudah disinggung tentang *trivector*, yaitu objek berbentuk:

$$a \wedge b \wedge c$$

- Interpretasi geometri *trivector* adalah menyatakan volume *parallelepiped* yang dibentuk oleh vector a , b , dan c



- Ketiga buah volume tersebut identik:

$$(a \wedge b) \wedge c = (b \wedge c) \wedge a = (c \wedge a) \wedge b.$$

- Misalkan

$$a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3$$

$$b = b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3$$

$$c = c_1 e_1 + c_2 e_2 + c_3 e_3$$

maka

$$a \wedge b \wedge c = (a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3) \wedge (b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3) \wedge (c_1 e_1 + c_2 e_2 + c_3 e_3)$$

$$\begin{aligned}
a \wedge b \wedge c &= (a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3) \wedge (b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3) \wedge (c_1 e_1 + c_2 e_2 + c_3 e_3) \\
&= \begin{pmatrix} a_1 b_1 e_1 \wedge e_1 + a_1 b_2 e_1 \wedge e_2 + a_1 b_3 e_1 \wedge e_3 + \\ a_2 b_1 e_2 \wedge e_1 + a_2 b_2 e_2 \wedge e_2 + a_2 b_3 e_2 \wedge e_3 + \\ a_3 b_1 e_3 \wedge e_1 + a_3 b_2 e_3 \wedge e_2 + a_3 b_3 e_3 \wedge e_3 \end{pmatrix} \wedge (c_1 e_1 + c_2 e_2 + c_3 e_3) \\
&= \begin{pmatrix} a_1 b_2 e_1 \wedge e_2 - a_1 b_3 e_3 \wedge e_1 - a_2 b_1 e_1 \wedge e_2 + \\ a_2 b_3 e_2 \wedge e_3 + a_3 b_1 e_3 \wedge e_1 - a_3 b_2 e_2 \wedge e_3 \end{pmatrix} \wedge (c_1 e_1 + c_2 e_2 + c_3 e_3) \\
a \wedge b \wedge c &= \begin{pmatrix} (a_1 b_2 - a_2 b_1) e_1 \wedge e_2 + (a_2 b_3 - a_3 b_2) e_2 \wedge e_3 \\ + (a_3 b_1 - a_1 b_3) e_3 \wedge e_1 \end{pmatrix} \wedge (c_1 e_1 + c_2 e_2 + c_3 e_3) \\
&= (a_1 b_2 - a_2 b_1) c_3 e_{123} + (a_2 b_3 - a_3 b_2) c_1 e_{123} + (a_3 b_1 - a_1 b_3) c_2 e_{123} \\
&= ((a_2 b_3 - a_3 b_2) c_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3) c_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1) c_3) e_{123} \\
&= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} e_{123}
\end{aligned}$$

Pseudoscalar trivector satuan

- *Pseudoscalar* di \mathbb{R}^2 (*bivector*):

$$I = e_1 \wedge e_2 = e_{12} = e_1 e_2$$

$$I^2 = (e_1 \wedge e_2)^2 = -1$$

- *Pseudoscalar* di \mathbb{R}^3 (*trivector*):

$$I = e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 = e_{123} = e_1 e_2 e_3$$

$$I^2 = (e_1 \wedge e_2 \wedge e_3)^2 = (e_1 e_2 e_3)^2$$

$$= e_1 e_2 e_3 e_1 e_2 e_3 = e_1 e_2 e_1 e_3 e_3 e_2$$

$$= e_1 e_2 e_1 e_2 = -1$$

- Sudah dibahas sebelumnya bahwa

$$a \wedge b \wedge c = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} e_{123}$$


maka volume *parallelepiped* adalah $V = \|a \wedge b \wedge c\|$

Contoh 4: Misalkan $a = 2e_1$ $b = 0.5e_1 + 2e_2$ $c = 3e_3$.

maka volume *parallelepiped* adalah

$$\begin{aligned} V &= \|a \wedge b \wedge c\| \\ &= \|2e_1 \wedge (0.5e_1 + 2e_2) \wedge 3e_3\| \\ &= \|4e_{12} \wedge 3e_3\| \\ &= \|12e_{123}\| \end{aligned}$$

$$V = 12.$$



Latihan

Diberikan tiga buah vektor di \mathbb{R}^3 sebagai berikut:

$$a = 3e_1 + 4e_2 + 5e_3$$

$$b = 2e_1 + 3e_2 + 4e_3$$

$$c = e_1 - 3e_2 - 2e_3$$

Tentukan volume *parallelepiped* yang dibentuk oleh vektor a , b , dan c .

Latihan (UAS 2022)

Menggunakan vektor $a = e_1 + 2e_2 - 2e_3$; $b = 2e_1 - e_2 + e_3$; $c = e_1 + 3e_2 + e_3$, hitunglah volume bangun ruang yang dibentuk oleh tiga vektor tersebut. (*nilai 5*)

Perkalian vektor basis satuan standard di \mathbb{R}^3

- Vektor basis satuan standard di \mathbb{R}^3 adalah e_1 , e_2 , dan e_3 .
- Hasil perkalian vektor satuan standard dengan dirinya sendiri:

$$e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = 1$$

- *Bivector* satuan standard:

$$e_{12} = e_1 \wedge e_2 \quad e_{23} = e_2 \wedge e_3 \quad e_{31} = e_3 \wedge e_1.$$

- Sifat imajiner bivector satuan:

$$e_{12}^2 = (e_1 \wedge e_2)^2 = -1$$

$$e_{23}^2 = (e_2 \wedge e_3)^2 = -1$$

$$e_{31}^2 = (e_3 \wedge e_1)^2 = -1.$$

Perkalian vektor dengan bivector satuan di \mathbb{R}^3


- Diberikan vektor di \mathbb{R}^3 : $a = a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3$
dan bivector satuan: $e_{12} = e_1 \wedge e_2$

- Perkalian bivector satuan dengan vektor:



$$e_{12}a = a_1e_{12}e_1 + a_2e_{12}e_2 + a_3e_{12}e_3$$

$$= -a_1e_2 + a_2e_1 + a_3e_{123}$$

$$e_{12}a = a_2e_1 - a_1e_2 + a_3e_{123}.$$


vektor volume

- Interpretasi geometrinya adalah, e_{12} menghasilkan efek:
 - (i) merotasi proyeksi vektor a pada bidang $e_1 \wedge e_2$ sejauh 90° searah jarum jam
 - (ii) membentuk volume a_3 dengan bidang alasnya $e_1 \wedge e_2$ dan tingginya e_3



- Jika urutan perkaliannya dibalik:

$$ae_{12} = a_1e_1e_{12} + a_2e_2e_{12} + a_3e_3e_{12}$$

$$= a_1e_2 - a_2e_1 + a_3e_{123}$$

$$ae_{12} = -a_2e_1 + a_1e_2 + a_3e_{123}.$$

- Interpretasi geometrinya adalah, e_{12} menghasilkan efek:
 - (i) merotasi proyeksi vektor a pada bidang $e_1 \wedge e_2$ sejauh 90° berlawanan arah jarum jam
 - (ii) membentuk volume a_3 dengan bidang alasnya $e_1 \wedge e_2$ dan tingginya e_3

- Dengan cara yang sama, maka

$$e_{23}a = a_1e_{23}e_1 + a_2e_{23}e_2 + a_3e_{23}e_3$$

$$= a_1e_{123} - a_2e_3 + a_3e_2$$

$$= a_3e_2 - a_2e_3 + a_1e_{123}$$

dan

$$ae_{23} = -a_3e_2 + a_2e_3 + a_1e_{123}.$$

- dan

$$e_{31}a = a_1e_{31}e_1 + a_2e_{31}e_2 + a_3e_{31}e_3$$

$$= a_1e_3 + a_2e_{123} - a_3e_1$$

$$= a_1e_3 - a_3e_1 + a_2e_{123}$$

dan

$$ae_{31} = -a_1e_3 + a_3e_1 + a_2e_{123}.$$

Latihan

Diberikan dua buah vektor di \mathbb{R}^3 sebagai berikut:

$$a = e_1 - 4e_2 + 2e_3$$

$$b = 3e_1 + e_2 - 4e_3$$

Hitunglah $ae_{12} + be_{12}$

Perkalian vektor dan bivector di \mathbb{R}^3

- Diberikan vektor di \mathbb{R}^3 : $a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3$
dan bivector: $B = b \wedge c$

- Perkalian geometri a dan B adalah (pembuktiannya tidak ditunjukkan di sini):

$$aB = a \cdot B + a \wedge B$$

- Perkalian geometri B dan a adalah (pembuktiannya tidak ditunjukkan di sini):

$$Ba = B \cdot a + B \wedge a$$

- Hubungan keduanya adalah:

$$a \cdot B = \frac{1}{2}(aB - Ba)$$

$$a \wedge B = \frac{1}{2}(aB + Ba)$$

Contoh 1: Diberikan tiga buah vektor di \mathbb{R}^3 sebagai berikut

$$a = 2e_1 + e_2 - e_3$$

$$b = e_1 - e_2 + e_3$$

$$c = 2e_1 + 2e_2 + e_3.$$

Hitunglah (i) $B = b \wedge c$ (ii) aB (iii) Ba (iv) $a \cdot B$ (v) $a \wedge B$

Jawaban:

$$(i) \quad B = b \wedge c = (e_1 - e_2 + e_3) \wedge (2e_1 + 2e_2 + e_3)$$

$$= 2e_{12} - e_{31} + 2e_{12} - e_{23} + 2e_{31} - 2e_{23}$$

$$B = 4e_{12} - 3e_{23} + e_{31}.$$

$$(ii) \quad aB = (2e_1 + e_2 - 2e_3)(4e_{12} - 3e_{23} + e_{31})$$

$$= 8e_2 - 6e_{123} - 2e_3 - 4e_1 - 3e_3 + e_{123} - 8e_{123} - 6e_2 - 2e_1$$

$$aB = -6e_1 + 2e_2 - 5e_3 - 13e_{123}. \quad \rightarrow \text{vektor + trivector}$$

$$(iii) \quad Ba = (4e_{12} - 3e_{23} + e_{31})(2e_1 + e_2 - 2e_3)$$

$$= -8e_2 + 4e_1 - 8e_{123} - 6e_{123} + 3e_3 + 6e_2 + 2e_3 + e_{123} + 2e_1$$

$$Ba = 6e_1 - 2e_2 + 5e_3 - 13e_{123}. \quad \rightarrow \text{vektor + trivector}$$

$$(iv) \quad a \cdot B = \frac{1}{2}(aB - Ba)$$

$$= \frac{1}{2}(-6e_1 + 2e_2 - 5e_3 - 13e_{123} - 6e_1 + 2e_2 - 5e_3 + 13e_{123})$$

$$= \frac{1}{2}(-12e_1 + 4e_2 - 10e_3)$$

$$a \cdot B = -6e_1 + 2e_2 - 5e_3. \quad \rightarrow \text{vektor}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(v)} \quad a \wedge B &= \frac{1}{2}(aB + Ba) \\
 &= \frac{1}{2}(-6e_1 + 2e_2 - 5e_3 - 13e_{123} + 6e_1 - 2e_2 + 5e_3 - 13e_{123}) \\
 a \wedge B &= -13e_{123}. \quad \rightarrow \text{trivector}
 \end{aligned}$$

Dari (iv) dan (v) terlihat bahwa:

$$aB = a \cdot B + a \wedge B$$

$$aB = -6e_1 + 2e_2 - 5e_3 - 13e_{123}.$$

yang berarti bahwa aB diidentifikasi oleh *inner product* ($a \cdot B$) dan *outer product* ($a \wedge B$)

Latihan (UAS 2022)

Diberikan tiga buah vektor sebagai berikut: $a = e_1 + 2e_2 - 2e_3$; $b = 2e_1 - e_2 + e_3$; dan $c = e_1 + 3e_2 + e_3$, dan $B = b \wedge c$, hitunglah:

a) $a \wedge (b + c)$ (*nilai 5*)

b) $a \cdot B$ (*nilai 5*)

Perkalian *bivector-bivector* satuan di \mathbb{R}^3

$$e_{12}^2 = e_{23}^2 = e_{31}^2 = -1$$

$$e_{12}e_{23} = e_{13} = -e_{31}$$

$$e_{23}e_{31} = e_{21} = -e_{12}$$

$$e_{31}e_{12} = e_{32} = -e_{23}$$

$$e_{12}e_{31} = e_{23}$$

$$e_{23}e_{12} = e_{31}$$

$$e_{31}e_{23} = e_{12}$$

TABLE 8.4

GP	e_{12}	e_{23}	e_{31}
e_{12}	-1	$-e_{31}$	e_{23}
e_{23}	e_{31}	-1	$-e_{12}$
e_{31}	$-e_{23}$	e_{12}	-1

Contoh cara mendapatkan salah satu hasil di samping:

$$\begin{aligned}
 e_{31}e_{23} &= e_3e_1e_2e_3 \\
 &= -e_3e_1e_3e_2 \\
 &= e_3e_3e_1e_2 \\
 &= e_3^2e_1e_2 \\
 &= (1)e_1e_2 = e_1e_2 = e_{12}
 \end{aligned}$$

Perkalian vektor dan *trivector* di \mathbb{R}^3

Perkalian vektor dengan *trivector* menghasilkan *bivector*

$$e_1 e_{123} = e_{23}$$

$$e_2 e_{123} = e_{31}$$

$$e_3 e_{123} = e_{12}$$



$$e_{123} e_1 = e_{23}$$

$$e_{123} e_2 = e_{31}$$

$$e_{123} e_3 = e_{12}$$

\therefore Perkalian vektor dengan *trivector* bersifat komutatif

Contoh 2: Diberikan vektor $a = 2e_1 + 3e_2 + 4e_3$ dan trivector $B = 5(e_1 \wedge e_2 \wedge e_3) = 5e_{123}$
Hitunglah aB .

Jawaban:

$$\begin{aligned} aB &= (2e_1 + 3e_2 + 4e_3) 5e_{123} \\ &= 10e_1e_{123} + 15e_2e_{123} + 20e_3e_{123} \\ &= 10e_1e_1e_2e_3 + 15e_2e_1e_2e_3 + 20e_3e_1e_2e_3 \\ &= 10e_2e_3 - 15e_2e_2e_1e_3 - 20e_3e_1e_3e_2 \\ &= 10e_2e_3 - 15e_1e_3 + 20e_3e_3e_1e_2 \\ &= 10e_2e_3 + 15e_3e_1 + 20e_1e_2 \\ &= 20e_1e_2 + 10e_2e_3 + 15e_3e_1 \\ &= 20e_{12} + 10e_{23} + 15e_{31} \end{aligned}$$

Perkalian vektor dengan *trivector* menghasilkan tiga buah *bivector*.

Perkalian *bivector* dan *trivector* di \mathbb{R}^3

Perkalian *bivector* dengan *trivector* menghasilkan vector

$$e_{12}e_{123} = -e_3$$

$$e_{23}e_{123} = -e_1$$

$$e_{31}e_{123} = -e_2.$$



$$e_{123}e_{12} = -e_3$$

$$e_{123}e_{23} = -e_1$$

$$e_{123}e_{31} = -e_2.$$

\therefore Perkalian bivector dengan *trivector* bersifat komutatif

Contoh 3 : Diberikan *bivector* $B = 2e_{12} + 3e_{23} + 4e_{31}$ dan *trivector* $C = 5e_{123}$
Hitunglah BC .

Jawaban:

$$\begin{aligned} B5e_{123} &= (2e_{12} + 3e_{23} + 4e_{31})5e_{123} \\ &= -15e_1 - 20e_2 - 10e_3. \end{aligned}$$

Ringkasan perkalian vektor di \mathbb{R}^3

TABLE 8.5

Inner product

Vectors commute

$$a \cdot b = b \cdot a$$

Vectors and bivectors anticommute

$$a \cdot B = -B \cdot a$$

$$a \cdot B = \frac{1}{2}(aB - Ba)$$

$$a \cdot B = (a \cdot b)c - (a \cdot c)b$$

$$B \cdot a = \frac{1}{2}(Ba - aB)$$

$$B \cdot a = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c$$

Outer product

Vectors anticommute

$$a \wedge b = -b \wedge a$$

Vectors and bivectors commute

$$a \wedge B = B \wedge a$$

$$a \wedge B = \frac{1}{2}(aB + Ba)$$

$$a \wedge B = abc$$

$$B \wedge a = \frac{1}{2}(Ba + aB)$$

$$B \wedge a = abc$$

Geometric product

Orthogonal vectors anticommute

$$e_{12} = -e_{21}$$

Orthogonal bivectors anticommute

$$e_{12}e_{23} = -e_{23}e_{12}$$

Bivectors square to -1

$$e_{12}^2 = e_{23}^2 = e_{31}^2 = -1$$

Definition

$$ab = a \cdot b + a \wedge b$$

Vectors and bivectors anticommute

$$aB = -Ba$$

$$aB = a \cdot B + a \wedge B$$

$$aB = (a \cdot b)c - (a \cdot c)b + abc$$

$$Ba = B \cdot a + B \wedge a$$

$$Ba = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c + abc$$

Trivector commutes with all multivectors in the space

$$aT = Ta \quad BT = TB$$

The pseudoscalar

$$e_{123} = I$$

Vectors and the pseudoscalar commute

$$aI = Ia$$

$$aI = a \cdot I$$

Duality transformation

$$e_{23} = Ie_1$$

$$e_{31} = Ie_2$$

$$e_{12} = Ie_3$$

The trivector squares to -1

$$I^2 = -1$$

Where a and b are vectors, B is a bivector, and T is a trivector.

TABLE 8.6

GP	λ	e_1	e_2	e_3	e_{12}	e_{23}	e_{31}	e_{123}
λ	λ^2	λe_1	λe_2	λe_3	λe_{12}	λe_{23}	λe_{31}	λe_{123}
e_1	λe_1	1	e_{12}	$-e_{31}$	e_2	e_{123}	$-e_3$	e_{23}
e_2	λe_2	$-e_{12}$	1	e_{23}	$-e_1$	e_3	e_{123}	e_{31}
e_3	λe_3	e_{31}	$-e_{23}$	1	e_{123}	$-e_2$	e_1	e_{12}
e_{12}	λe_{12}	$-e_2$	e_1	e_{123}	-1	$-e_{31}$	e_{23}	$-e_3$
e_{23}	λe_{23}	e_{123}	$-e_3$	e_2	e_{31}	-1	$-e_{12}$	$-e_1$
e_{31}	λe_{31}	e_3	e_{123}	$-e_1$	$-e_{23}$	e_{12}	-1	$-e_2$
e_{123}	λe_{123}	e_{23}	e_{31}	e_{12}	$-e_3$	$-e_1$	$-e_2$	-1

Keterangan: GP = Geometry Product

Bersambung ke Bagian 2